

SOAL SNMPTN 2010



Tes Bidang Studi

IPA

60 Soal - 90 Menit

Mtk. IPA
Fisika
Kimia
Biologi



Matematika IPA

Gunakan **PETUNJUK A** untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 15!

- 1 Diketahui suku banyak $P(x) = x^4 + 2x^3 - 9x^2 - 2x + k$ habis dibagi $x - 2$. Jika $P(x)$ dibagi $x - 1$ sisanya adalah
A. 8 C. 0 E. -2
B. 4 D. -1
- 2 Jika garis singgung kurva $y = 2x \cos 3x$ di titik $(\pi, -2\pi)$ tegak lurus dengan garis g , maka persamaan garis g adalah
A. $y = 2x - 3\pi$ D. $y = \frac{1}{2}x + 3\pi$
B. $y = 2x + \pi$ E. $y = \frac{1}{2}x + \pi$
C. $y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}\pi$
- 3 Nilai p agar vektor $pi + 2j - 6k$ dan $4i - 3j + k$ saling tegak lurus adalah
A. 6 C. 1 E. -6
B. 3 D. -1

- 4 Persamaan kuadrat yang mempunyai akar a dan b sehingga $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{7}{10}$ adalah
A. $x^2 + 7x - 10 = 0$ D. $x^2 - 7x - 10 = 0$
B. $x^2 + 7x + 10 = 0$ E. $x^2 - 7x + 10 = 0$
C. $x^2 - 10x + 7 = 0$
- 5 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan $\frac{2 - \sin \theta}{\cos \theta} \leq \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$ untuk $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ adalah
A. $0 < \theta \leq \frac{\pi}{6}$ D. $\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{\pi}{3}$
B. $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ E. $\frac{\pi}{6} < \theta \leq \frac{\pi}{3}$
C. $0 < \theta \leq \frac{\pi}{3}$
- 6 Diketahui limas beraturan $T. ABCD$ dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P pada CT sehingga $TP : PC = 2 : 1$. Jarak P ke bidang BDT adalah
A. 1 C. $\sqrt{2}$ E. $2\sqrt{2}$
B. 2 D. $\sqrt{3}$

- 7 Panjang dua sisi suatu segitiga adalah 10 cm dan 8 cm. Semua nilai berikut dapat menjadi nilai keliling segitiga tersebut *kecuali*

A. 33 cm D. 36 cm
B. 34 cm E. 37 cm
C. 35 cm

- 8 Diketahui fungsi g kontinu di $x = 3$ dan $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = 2$.

Nilai $\lim_{x \rightarrow 3} \left(g(x) \frac{x-3}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} \right)$ adalah

A. $4\sqrt{3}$ D. 4
B. $2\sqrt{3}$ E. 2
C. $\sqrt{3}$

- 9 Diketahui fungsi f dan g dengan $g(x) = f(x^2 + 2)$. Jika diketahui bahwa $g'(1) = 8$ maka nilai $f'(3)$ adalah

A. 8 D. 2
B. 6 E. 1
C. 4

- 10 Diberikan barisan $u_n = (-1, 1, -1, 1, \dots)$ dengan n bilangan asli. Semua yang berikut merupakan rumus umum untuk barisan itu *kecuali*

A. $u_n = (-1)^n$
B. $u_n = -\sin\left(n - \frac{1}{2}\right)\pi$
C. $u_n = -\cos(n-1)\pi$
D. $u_n = -\sin(n-1)\pi$
E. $u_n = \begin{cases} -1, & \text{jika } n \text{ ganjil} \\ 1, & \text{jika } n \text{ genap} \end{cases}$

- 11 Rumah di Jalan Veteran dinomori secara urut mulai 1 sampai dengan 150. Berapa banyak rumah yang nomornya menggunakan angka 8 sekurang-kurangnya satu kali?

A. 14 C. 21 E. 30
B. 15 D. 24

- 12 Suatu kelas terdiri atas 10 pelajar pria dan 20 pelajar wanita. Separuh pelajar pria memakai arloji dan separuh pelajar wanita juga memakai arloji. Jika dipilih satu pelajar maka peluang yang terpilih wanita atau memakai arloji adalah

A. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{4}$ E. $\frac{5}{6}$
B. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

- 13 Daerah R di kuadran satu, dibatasi oleh grafik $y = x^2$, $y = x + 2$, dan $y = 0$. Integral yang menyatakan luas daerah R adalah

A. $\int_{-2}^{-1} (x+2) dx \int_{-1}^0 x^2 dx$
B. $\int_{-1}^{-2} (x+2) dx - \int_{-1}^0 x^2 dx$
C. $\int_{-1}^{-2} x^2 dx + \int_{-1}^0 (x+2) dx$
D. $\int_0^2 -x^2 + x + 2 dx$
E. $\int_0^2 (x^2 + x - 2) dx$

- 14 Luas daerah pada bidang XOY yang memenuhi hubungan $|x| + |y| \leq 2$ adalah

A. 8 C. 4 E. 1
B. 6 D. 2

- 15 Diketahui fungsi f dengan $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 3, & x = 1 \end{cases}$

Semua pernyataan berikut benar *kecuali*

A. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$
B. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1)$
C. f mempunyai turunan di $x = 1$
D. f tidak kontinu di $x = 1$
E. f kontinu di $x = 0$



FISIKA

Daftar konstanta alam sebagai pelengkap soal-soal fisika.

$$g = 10 \text{ m/s}^2 \text{ (kecuali diberitahukan lain);}$$

$$m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg;}$$

$$1 \text{ sma} = 931 \text{ Mev;}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s;}$$

$$N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ molekul/mol;}$$

$$R = 8,31 \text{ J/K}^{\circ}\text{mol}^{-1}$$

$$h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ Js;}$$

$$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C;}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m;}$$

$$(4\pi \epsilon_0)^{-1} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2;$$

$$k_b = 1,38 \times 10^{-23} \text{ JK;}$$

GUNAKAN Petunjuk A untuk menjawab soal no. 16 sampai dengan no.25!

- 16 Suhu gas nitrogen pada saat kelajuannya rms-nya (*root mean square*) sama dengan v_1 adalah 300 K. Jika kelajuan rms gas nitrogen diperbesar menjadi dua kali dari v_1 maka suhu gas nitrogen tersebut berubah menjadi
- A. 425 C. 1146 E. 2292
B. 600 D. 1200

- 17 Seorang sopir sedang mengendarai sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap 25 m/s. Ketika sopir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan, diperlukan waktu 0,10 s bagi sopir untuk bereaksi dan mengerem. Akibatnya, mobil melambat dengan percepatan tetap 5,0 m/s² dan berhenti. Jarak total yang ditempuh mobil tersebut sejak sopir melihat anak menyeberang hingga mobil berhenti adalah
- A. 11,00 m D. 48,00 m
B. 37,00 m E. 65,00 m
C. 38,25 m

- 18 Jika kecepatan rata-rata sebuah benda sama dengan nol maka ...
- A. Benda bergerak dengan kecepatan tetap
B. Jarak yang ditempuhnya sama dengan nol
C. Benda bergerak bolak-balik
D. Perpindahan benda itu sama dengan nol
E. Kelajuan rata-rata benda sama dengan nol

- 19 Sebuah mesin Carnot menyerap panas dari tendon panas bertemperatur 127°C dan membuang sebagian panasnya ke tendon dingin bertemperatur 27°C. Efisiensi terbesar yang dapat dicapai oleh mesin Carnot tersebut adalah
- A. 100% C. 70,25% E. 20,5%
B. 90,7% D. 25%

- 20 Untuk mendeteksi struktur sebuah inti yang beradius 10^{-15} m , seberkas elektron dari sebuah akselerator partikel ditembakkan pada sebuah target padat yang mengandung kerapatan inti yang tinggi. Jika panjang gelombang elektron sama dengan radius inti, maka akan terjadi efek difraksi dan ukuran inti dapat ditentukan. Dalam kasus ini besar momentum berkas elektron yang diperlukan adalah
- ($h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}$)
- A. $6,6 \times 10^{-19} \text{ kg ms}^{-1}$
B. $13,2 \times 10^{-19} \text{ kg ms}^{-1}$
C. $0,33 \times 10^{-19} \text{ kg ms}^{-1}$
D. $3,3 \times 10^{-19} \text{ kg ms}^{-1}$
E. $2,3 \times 10^{-19} \text{ kg ms}^{-1}$

- 21 Dawai gitar yang memiliki panjang 1 m dan massa 10 g menghasilkan bunyi nada atas pertama pada frekuensi 400 Hz. Berapakah besar tegangan pada dawai gitar tersebut?
- A. 176,89 N D. 902,26 N
B. 350,72 N E. 1600,00 N
C. 879,56 N

- 22 Deskripsi bayangan sebuah benda yang terletak 20 cm dari sebuah cermin sferis cembung berjari-jari 60 cm adalah
- A. Maya, tegak, 60 cm di depan cermin, diperbesar 3 kali

- B. Maya, tegak, 60 cm di belakang cermin, diperbesar 3 kali
 C. Maya, tegak, 12 cm di belakang cermin, diperbesar 3/5 kali
 D. Maya, tegak, 12 cm di depan cermin, diperkecil 3 kali
 E. Maya, tegak, 60 cm di belakang cermin, diperkecil 1/3 kali

- 23 Empat buah muatan masing-masing $q_1 = -2 \mu\text{C}$, $q_2 = 1 \mu\text{C}$, $q_3 = -1 \mu\text{C}$, dan $q_4 = 1 \mu\text{C}$ terletak di sudut-sudut suatu bujur sangkar bersisi 0,2 m. Bila diketahui ϵ_0 adalah permitivitas vakum maka potensial listrik di titik tengah bujur sangkar tersebut adalah

- A. $\frac{5\sqrt{2}}{4\pi\epsilon_0} \mu\text{V}$ D. $-\frac{5\sqrt{2}}{8\pi\epsilon_0} \mu\text{V}$
 B. $-\frac{5\sqrt{2}}{4\pi\epsilon_0} \mu\text{V}$ E. 0 V
 C. $\frac{5\sqrt{2}}{8\pi\epsilon_0} \mu\text{V}$

- 24 Dua buah muatan titik masing-masing sebesar $10 \mu\text{C}$ dan $4 \mu\text{C}$ terpisah sejauh 10 cm. Kedua muatan tersebut berada di dalam medium yang memiliki permitivitas relatif sebesar 3. Berapakah besar gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut ?
 A. 10 N D. 72 N
 B. 12 N E. 100 N
 C. 36 N

- 25 Sebuah benda digantung pada sebuah neraca pegas di dalam elevator. Pembacaan skala pada neraca pegas adalah T_i newton ketika elevator diam. Bila elevator dipercepat ke bawah sebesar 5 m/s^2 , berapa pembacaan skala neraca pegas sekarang? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A. $T_i\sqrt{2}$ D. $\frac{T_i}{2}$
 B. T_i E. $2T_i$
 C. $\frac{T_i}{\sqrt{2}}$

Gunakan Petunjuk B untuk menjawab soal no.26 dan no.27!

- 26 Pada benda diam, resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah nol.

SEBAB

Pada benda diam tidak ada satu pun gaya yang bekerja padanya.

- 27 Gaya coulomb dan gaya gravitasi merupakan gaya konservatif.

SEBAB

Gaya coulomb dan gaya gravitasi besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak.

Gunakan Petunjuk C untuk menjawab soal no.28 sampai dengan no.30!

- 28 Dari hukum pergeseran Wien untuk radiasi termal benda hitam dapat disimpulkan bahwa

- (1). Makin tinggi suhu suatu benda, benda tersebut akan cenderung berwarna merah
- (2). Makin tinggi suhu suatu benda, frekuensi gelombang radiasi benda tersebut semakin tinggi
- (3). Intensitas radiasi benda hitam tidak bergantung pada temperatur
- (4). Makin rendah suhu suatu benda, benda tersebut akan cenderung berwarna merah

- 29 Jika sebuah bola pejal konduktor berjari-jari R diberi muatan listrik $+Q$ maka berikut ini pernyataan yang benar adalah

- (1). Muatan terdistribusi secara merata di permukaan bola
- (2). Medan listrik di dalam bola sama dengan nol
- (3). Potensial listrik di dalam bola adalah tetap
- (4). Muatan terdistribusi secara merata di dalam bola

- 30 Suatu gaya merupakan gaya konservatif jika kerja yang dilakukannya terhadap benda

- (1). Hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir
- (2). Sama dengan perubahan energi potensial benda

- 

39. Sebanyak 100 mL larutan NaOH 0,1 M dicampur dengan 100 mL larutan asam sitrat $\text{H}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$ 0,1 M. Setelah terjadi kesetimbangan, ion-ion berikut yang mempunyai konsentrasi paling besar adalah ...

A. $\text{H}_2\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7^-$ D. OH^-
 B. $\text{HC}_6\text{H}_5\text{O}_7^{2-}$ E. H^+
 C. $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7^{3-}$

40. Reaksi antara metanol (CH_3OH) dan asam propanoat ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$) yang dipanaskan pada suhu tertentu akan menghasilkan ...
 A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3$ dan H_2O
 B. $\text{CH}_3\text{COCOCH}_3$ dan H_2O
 C. CH_3COOH dan CH_3COH
 D. $\text{HOCH}(\text{CH}_2\text{OH})_2$ dan CH_2O
 E. $\text{CH}_3\text{CHOHCH}_2\text{OH}$ dan H_2O

Gunakan **PETUNJUK C** untuk menjawab soal nomor 41 sampai dengan nomor 43!

41. Percobaan penentuan titik beku larutan garam NaCl dan larutan urea $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ menghasilkan data sebagai berikut:


Larutan	Konsentrasi (molal)	Titik beku ($^{\circ}\text{C}$)
NaCl	0,1	-0,372
NaCl	0,2	-0,744
$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	0,1	-0,186
$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	0,2	-0,372

Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan titik beku larutan ...

- (1) berbanding lurus dengan konsentrasi
 (2) elektrolit lebih tinggi dari non elektrolit dengan konsentrasi yang sama
 (3) bergantung pada jenis ikatan kimia senyawa terlarut
 (4) bergantung pada jenis unsur penyusun senyawa terlarut

42. Di antara molekul-molekul yang disusun dari atom-atom ${}_7\text{N}$, ${}_8\text{O}$, ${}_9\text{F}$, ${}_{16}\text{S}$, dan ${}_{17}\text{Cl}$, yang bersifat polar adalah ...
 (1) ClNO
 (2) SF_4
 (3) HCN
 (4) NO

43. Reaksi pembentukan H_2O dari unsur-unsurnya berlangsung sebagai berikut:




Energi pembentukan $\text{O}(\text{g})$ dan $\text{H}(\text{g})$ masing-masing adalah 248 kJ/mol dan 227 kJ/mol, sedangkan energi ikat O-H adalah 464 kJ/mol. Pernyataan yang benar untuk reaksi tersebut adalah ...

- (1) perubahan entalpi reaksi adalah -452 kJ
 (2) perubahan entalpi pembentukan O_2 adalah 248 kJ
 (3) perubahan entalpi pembentukan standar $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ adalah -226 kJ
 (4) perubahan entalpi pembentukan $\text{H}_2(\text{g})$ adalah 870 kJ

Gunakan **PETUNJUK B** untuk menjawab soal nomor 44 dan nomor 45!

44. Penurunan temperatur pada reaksi kesetimbangan:



akan memperbesar harga tetapan kesetimbangan reaksi tersebut

SEBAB

Nilai tetapan kesetimbangan (K) bergantung pada temperatur.

45. Korosi pada aluminium tidak menyebabkan logam tersebut keropos seperti korosi pada besi.

SEBAB

Oksigen lebih mudah mengoksidasi besi dibandingkan dengan mengoksidasi aluminium ($E^{\circ} \text{O}_2/\text{H}_2\text{O} = +1,23 \text{ V}$; $E^{\circ} \text{Fe}^{2+}/\text{Fe} = -0,44 \text{ V}$; $E^{\circ} \text{Al}^{3+}/\text{Al} = -1,676 \text{ V}$)



Gunakan **PETUNJUK A** untuk menjawab soal nomor 46 sampai dengan nomor 55!

46. Sel-sel yang mengalami meiosis dalam tubulus seminiferus adalah ...
 A. spermatid
 B. spermatozoa

- C. spermatogonia
- D. spermatosit primer
- E. spermatosit sekunder

47 Molekul atau senyawa yang dapat berikatan dengan hemoglobin adalah ...

- A. oksigen dan nitrogen
- B. oksigen dan karbon monoksida
- C. karbon monoksida dan nitrogen
- D. karbon monoksida dan karbon dioksida
- E. oksigen, karbon monoksida, dan karbon dioksida

48 Peranan gen asing di bawah ini merupakan keberhasilan rekayasa genetika, **kecuali** ...

- A. yang dimasukkan melalui plasmid terekspresi pada tumbuhan atau hewan transgenik
- B. yang dimasukkan melalui plasmid akan berintegrasi dengan genom tanaman target
- C. berkombinasi dengan DNA genom yang terdapat di dalam inti
- D. turut direplikasi pada tanaman atau hewan transgenik
- E. mempertahankan ekspresi gen target

49 Urutan pembentukan ATP pada proses respirasi aerob yang benar adalah ...

- A. siklus Krebs - glikolisis - pembentukan asetil ko A - transport elektron
- B. transport elektron - glikolisis - pembentukan asetil ko A - siklus Krebs
- C. glikolisis - pembentukan asetil ko A - siklus Krebs - transport elektron
- D. glikolisis - siklus Krebs - pembentukan asetil ko A - transport elektron
- E. pembentukan asetil ko A - transport elektron - siklus Krebs - glikolisis

50 Berikut merupakan ciri kelas Phaeophyta, **kecuali** ...

- A. ganggang pirang
- B. hidup di air tawar
- C. mengandung pigmen fikosantin
- D. dinding sel mengandung selulosa dan algin
- E. berkembangbiakan dengan pergiliran keturunan

51 Pernyataan yang benar tentang keberhasilan proses evolusi konvergensi adalah ...

- A. spesies yang berkerabat jauh tampak sekerabat dekat
- B. spesies sama yang menempati lingkungan berbeda
- C. memiliki organ tubuh yang secara anatomi sama
- D. fungsi organ tubuh berbeda meskipun secara anatomi sama
- E. fungsi organ tubuh berbeda karena secara anatomi berbeda

52 Dalam proses fotosintesis, pernyataan yang benar mengenai fosforilasi siklik dan nonsiklik adalah ...

	Fosforilasi Siklik	Fosforilasi Nonsiklik	Fosforilasi Siklik dan Nonsiklik
A.	Tidak terbentuk NADPH	dihasilkan ATP	dihasilkan oksigen
B.	tidak terbentuk NADPH	dihasilkan oksigen	dihasilkan ATP
C.	dihasilkan ATP	dihasilkan oksigen	tidak terbentuk NADPH
D.	dihasilkan ATP	tidak terbentuk NADPH	dihasilkan oksigen
E.	dihasilkan oksigen	dihasilkan ATP	tidak terbentuk NADPH

53 Interaksi antarorganisme berikut yang termasuk dalam kategori kompetisi intraspesifik adalah interaksi antara ...

- A. sesama anggota kupu-kupu dengan spesies sama yang mendiami suatu populasi
- B. sesama anggota kumbang dengan beragam spesies yang mendiami suatu populasi
- C. benalu dengan pohon inangnya
- D. semut dengan pohon rambutan
- E. sapi dan rumput

- 54 Organel sel tumbuhan berpembuluh yang mengandung DNA adalah ...

A. inti saja
B. kloroplas saja
C. inti dan kloroplas
D. kloroplas dan mitokondria
E. inti, kloroplas, dan mitokondria

- 55 Pada irisan melintang sel makhluk hidup dapat dilihat organel inti dan mitokondria dengan mikroskop

A. fase kontras
B. fluorescens
C. cahaya
D. elektron payaran (*scanning electron microscope*)
E. elektron transmisi (*transmission electron microscope*)

Gunakan PETUNJUK B untuk menjawab soal nomor 56 dan nomor 57!

- 56 Penghambatan produksi hormon LH mengakibatkan peningkatan produksi progesteron.

SEBAB

Produksi progesteron merupakan sekresi dari korpus luteum yang terbentuk setelah ovulasi.

- 57 Pengambilan ovarium anak ayam yang baru menetas mengakibatkan berkembangnya ciri kelamin jantan sekunder.

SEBAB

Hilangnya ovarium anak ayam memacu perkembangan testis.

Gunakan PETUNJUK C untuk menjawab soal nomor 58 sampai dengan nomor 60!

- 58 Pernyataan berikut yang benar mengenai danau oligotrofik dan danau eutrofik adalah ...

(1) laju fotosintesis lebih tinggi pada danau eutrofik
(2) danau oligotrofik lebih besar kemungkinannya mengalami kekurangan oksigen
(3) danau eutrofik lebih kaya nutrisi
(4) sedimen pada danau oligotrofik mengandung lebih banyak materi organik yang dapat didekomposisi

- 59 Pasangan organel sel dan fungsinya yang benar adalah ...

(1) inti – pusat pengendali gerak
(2) vakuola – absorpsi air
(3) lisosom – mencerna organel rusak
(4) kloroplas – mengubah energi cahaya

- 60 Hewan yang bertulang belakang, berdarah dingin, bertubuh bilateral simetris, dan bersisik adalah ...

(1) ular
(2) penyu
(3) buaya
(4) salamander